

レジメン番号： 12-004 / 皮膚4
 適応疾患： 根治切除不能な悪性黒色腫
 レジメン名： ヤーボイ

化学療法内容

(1コース 3 週間)

Rp	薬剤名	標準量	投与スケジュール(日)			
			1	8	15	21
1	ヤーボイ ※1 生食(100) 点滴静注 30分	3 mg/kg 1 B	↑	×	×	
2	生食(50) 点滴静注 全開でフラッシュ	1 B	↑	×	×	

※1 投与時はインラインフィルターを用いる。投与は4回まで。
 最終濃度が1~4mg/mLとなるように調製する
 (125mg未満:1mg/mL、125mg以上:Total 100mLとする)。

レジメン番号： 12-008 / 皮膚8

適応疾患：悪性黒色腫

レジメン名：ダカルバジン(5日投与)

化学療法内容

(1コース 4 週間)

Rp	薬剤名	標準量	投与スケジュール(日)						
			1	2	3	4	5	・	28
1	デキサート(6.6mg/2mL) グラニセトンバッグ(3mg/50mL) 点滴静注 15分	1 V 1 B	↑	↑	↑	↑	↑		
2	ダカルバジン ※1 蒸留水(100)・・・溶解用 生食(100) 点滴静注 15分	200-220 mg/m ² 1 B 1 B	↑	↑	↑	↑	↑		
3	生食(50) 点滴静注 全開でフラッシュ	1 B	↑	↑	↑	↑	↑		

※1 ダカルバジン投与時は投与ルートおよび点滴バッグ本体を遮光する。

レジメン番号： 12-009 / 皮膚9
 適応疾患： 悪性黒色腫
 レジメン名： オブジーボ(隔週)

化学療法内容

(1コース 2 週間)

Rp	薬剤名	標準量	投与スケジュール(日)		
			1	8	14
1	オブジーボ ※1 生食(50) 点滴静注 30分	240 mg/body 1 B	↑	×	
2	生食(50) 点滴静注 全開でフラッシュ	1 B	↑	×	

◆ 術後補助療法の場合は、投与期間は12ヶ月間までとする。

※1 投与時はインラインフィルターを用いる。

レジメン番号： 12-011 / 皮膚11

適応疾患：悪性黒色腫

レジメン名：キイトルーダ(3週毎)

化学療法内容

(1コース 3 週間)

Rp	薬剤名	標準量	投与スケジュール(日)			
			1	8	15	21
1	キイトルーダ ※1 生食(100) 点滴静注 30分	200 mg/body 1 B	↑	×	×	
2	生食(50) 点滴静注 全開でフラッシュ	1 B	↑	×	×	

◆ 術後補助療法の場合は、投与期間は12ヶ月間までとする。

※1 投与時はインラインフィルターを用いる。

レジメン番号： 12-015 / 皮膚15

適応疾患： 根治切除不能な悪性黒色腫

レジメン名： オブジーボ+ヤーボイ

化学療法内容

(1コース 3 週間)

Rp	薬剤名	標準量	投与スケジュール(日)			
			1	8	15	21
1	オブジーボ 生食(100) 点滴静注 30分	※1 80 mg/body 1 B	↑	×	×	
2	生食(100) 点滴静注 30分	1 B	↑	×	×	
3	ヤーボイ 生食(100) 点滴静注 30分	※2 3 mg/kg 1 B	↑	×	×	
4	生食(50) 点滴静注 全開でフラッシュ	1 B	↑	×	×	

◆ 投与は4回まで。

※1 投与時はインラインフィルターを用いる。

※2 投与時はインラインフィルターを用いる。

最終濃度が1~4mg/mlとなるように調製する(125mg未満:1mg/ml、125mg以上:Total 100m Lとする)。

レジメン番号： 12-021 / 皮膚21

適応疾患： 悪性黒色腫

レジメン名： オプジーボ(4週毎)

化学療法内容

(1コース 4 週間)

Rp	薬剤名	標準量	投与スケジュール(日)				
			1	8	15	22	28
1	オプジーボ 生食(100) 点滴静注 30分	※1 480 mg/body 1 B	↑	×	×	×	
2	生食(50) 点滴静注 全開でフラッシュ	1 B	↑	×	×	×	

◆ 術後補助療法の場合は、投与期間は12ヶ月間までとする。

※1 投与時はインラインフィルターを用いる。

体重が30kg未満の場合は、Total 100mLに調製する。

レジメン番号： 12-022 / 皮膚22

適応疾患：悪性黒色腫

レジメン名：キイトルーダ(6週毎)

化学療法内容

(1コース 6 週間)

Rp	薬剤名	標準量	投与スケジュール(日)						
			1	8	15	22	29	36	42
1	キイトルーダ 生食(100) 点滴静注 30分	※1 400 mg/body 1 B	↑	×	×	×	×	×	×
2	生食(50) 点滴静注 全開でフラッシュ	1 B	↑	×	×	×	×	×	×

◆ 術後補助療法の場合は、投与期間は12ヶ月間までとする。

※1 投与時はインラインフィルターを用いる。

レジメン番号： 12- 023 / 皮膚23

適応疾患：悪性黒色腫

レジメン名：ダカルバジン(1日投与)

化学療法内容

(1コース 3~4週間)

Rp	薬剤名	標準量	投与スケジュール(日)				
			1	8	15	21	~ 28
1	デキサート(6.6mg/2mL) アロカリス(235mg/10mL) パロノセトロンバッグ(0.75mg/50mL) 点滴静注 30分	1.5 V 1 V 1 B	↑	×	×		
2	ダカルバジン ※1 蒸留水(100)・・・溶解用 生食(250) 点滴静注 60分	800~1000 mg/m ² 2 B 1 B	↑	×	×		
3	生食(50) 点滴静注 全開でフラッシュ	1 B	↑	×	×		
	デカドロン錠(0.5) 経口 1日2回朝・昼食後に分けて内服	16 T	day2~4				

※1 ダカルバジン投与時は投与ルートおよび点滴バッグ本体を遮光する。

レジメン番号： 12-024 / 皮膚24

適応疾患： 再発又は難治性の皮膚T細胞性リンパ腫

レジメン名： レミトロ

化学療法内容

(1コース 3 週間)

Rp	薬剤名	標準量	投与スケジュール(日)						
			1	2	3	4	5	・	21
	カロナール錠(200) 経口	3 T	↑	↑	↑	↑	↑		
	点滴開始と同時に内服								
1	デキサート(6.6mg/2mL) ポララミン(5mg/1mL) 生食(50) 点滴静注	1 V 1 A 1 B	↑	↑	↑	↑	↑		
	15 分								
2	生食(250) 点滴静注	1 B	↑	↑	↑	↑	↑		
	30 分								
3	レミトロ 蒸留水(20)・・・溶解用 生食(50) 点滴静注	※1 9 μg/kg 1 A 1 B	↑	↑	↑	↑	↑		
	60 分								
4	生食(250) 点滴静注	1 B	↑	↑	↑	↑	↑		
	30 分								

※1 希釈後の濃度は3 μg/mL以上となるように調製すること。インラインフィルターは使用しないこと。

レジメン番号 : 12- 025 / 皮膚25

適応疾患 : 根治切除不能なメルケル細胞癌

レジメン名 : バベンチオ

化学療法内容

(1コース 2 週間)

Rp	薬剤名	標準量	投与スケジュール(日)		
			1	8	14
	レスタミンコーワ錠(10) カロナール錠(200) 経口	5 T 3 T	↑	×	
	バベンチオ開始30分前に内服				
1	バベンチオ 生食(250) 点滴静注	※1 10 mg/kg 1 B	↑	×	
	60 分				
2	生食(50) 点滴静注	1 B	↑	×	
	全開でフラッシュ				

※1 投与時はインラインフィルターを用いる。