

レジメン番号： 16- 001 / 神経内分泌1

適応疾患：膵・消化管神経内分泌腫瘍

レジメン名：ザノサー

化学療法内容

(1コース 1 週間)

Rp	薬剤名	標準量	投与スケジュール(日)	
			1	7
1	生食(1000) 点滴静注(メイン) 120 分	1 B	↑	
2	デキサート(6.6mg/2mL) アロカリス(235mg/10mL) パロノセトロンバッグ(0.75mg/50mL) 点滴静注(サブ) 30 分	1.5 V 1 V 1 B	↑	
3	ザノサー 生食(100) 点滴静注(サブ) 30 分	1000 mg/m <sup>2</sup> 1 B	↑	
4	生食(250) 点滴静注(サブ) 30 分	1 B	↑	
	デカドロン錠(0.5) 経口 1日2回朝・昼食後に分けて内服	16 T		day2~4

レジメン番号： 16- 006 / 神経内分泌6  
 適応疾患： 神経内分泌腫瘍・神経内分泌癌(小細胞癌)  
 レジメン名： PI療法

化学療法内容

(1コース 4 週間)

Rp	薬剤名	標準量	投与スケジュール(日)				
			1	8	15	22	28
1	デキサート(6.6mg/2mL) アロカリス(235mg/10mL) パロノセトロンバッグ(0.75mg/50mL) 点滴静注 30分	1.5 V 1 V 1 B	↑	×	×	×	
2	デキサート(6.6mg/2mL) アロカリス(235mg/10mL) グラニセトロンバッグ(3mg/50mL) 点滴静注 30分	1 V 1 V 1 B	×	↑	↑	×	
3	イリノテカン ソルデム1(200) 点滴静注 90分	60 mg/m <sup>2</sup> 1 B	↑	↑	↑	×	
4	硫酸Mg注(20mEq/20mL) ソルデム3A(500) 点滴静注 60分	1 A 1 B	↑	×	×	×	
5	マンニトール(300) 点滴静注 45分	※1 1 B	↑	×	×	×	
6	シスプラチン 生食(500) 点滴静注 60分	※2 60 mg/m <sup>2</sup> 1 B	↑	×	×	×	
7	生食(500) 点滴静注 60分	1 B	↑	×	×	×	
8	ソルデム3A(500) 点滴静注 60分	1 B	↑	×	×	×	
9	生食(50) 点滴静注 全開でフラッシュ	1 B	×	↑	↑	×	
	デカドロン錠(0.5) 経口 1日2回朝・昼食後に分けて内服	16 T	day2~4				

※1 マンニトールによる血管痛予防のためホットパックを使用すること。

※2 Total 500 mLに調製する。

シスプラチンによる腎障害予防のため、day1~3は1000 mL/日以上 of 飲水を行うこと。

レジメン番号： 16- 007 / 神経内分泌7

適応疾患： 神経内分泌腫瘍・神経内分泌癌(小細胞癌)

レジメン名： CE療法

化学療法内容

(1コース 3~4週間)

Rp	薬剤名	標準量	投与スケジュール(日)						
			1	2	3	・	21	~	28
1	デキサート(6.6mg/2mL) アロカリス(235mg/10mL) パロノセトロンバッグ(0.75mg/50mL) 点滴静注 30分	1 V 1 V 1 B	↑	×	×				
2	デキサート(6.6mg/2mL) 生食(50) 点滴静注 15分	1 V 1 B	×	↑	↑				
3	カルボプラチン ※1 生食(250) 点滴静注 60分	5 (AUC) 1 B	↑	×	×				
4	エトポシド 生食(500) 点滴静注 120分	80 mg/m <sup>2</sup> 1 B	↑	↑	↑				
5	生食(50) 点滴静注 全開でフラッシュ	1 B	↑	↑	↑				

※1 投与量はカルバートの式に従う。カルボプラチン投与量 = 目標AUC × (25 + GFR)

レジメン番号： 16- 009 / 神経内分泌9

適応疾患： 神経内分泌腫瘍・神経内分泌癌(小細胞癌)

レジメン名： イリノテカン(添付文書A法)

化学療法内容

(1コース 5 週間)

Rp	薬剤名	標準量	投与スケジュール(日)				
			1	8	15	22	29
1	デキサート(6.6mg/2mL) アロカリス(235mg/10mL) グラニセトロンバッグ(3mg/50mL) 点滴静注 30分	1 V 1 V 1 B	↑	↑	↑	×	×
2	イリノテカン ソルデム1(200) 点滴静注 90分	100 mg/m <sup>2</sup> 1 B	↑	↑	↑	×	×
3	生食(50) 点滴静注 全開でフラッシュ	1 B	↑	↑	↑	×	×