

# 乳癌経口抗がん剤トレーシングレポート連携 運用方法・手順

---



2021年3月28日(日) 保険業務研修会

がん薬薬連携を考える

-乳癌におけるチェック式トレーシングレポートの有効活用-

より一部抜粋

# <使用されるツール>

## ・施設間情報提供書・トレーニングレポート(以下、TR)

エベロリムス（アフィニートール<sup>®</sup>）+ ホルモン剤

**施設間情報連絡書**

調剤薬局様 御中

**(表面)**

金沢大学附属病院  
乳腺外科 石川聡子  
TEL :  
FAX :

当用紙を持参された患者様の服薬指導にあたり  
裏面の服薬情報提供書を用いた情報提供をお願いします。

※本日の容態は聞き取りましたので、〇日～〇日後の容態をお聞きいただけますと幸いです

コメント

特に変わったことはありません

エベロリムス（アフィニートール<sup>®</sup>）+ ホルモン剤

**服薬情報提供書 (トレーニングレポート)**

報告日： 年 月 日

金沢大学附属病院 乳腺外科 御中

**(裏面)**

医療機関名  
薬剤師氏名  
住 所  
電 話 番 号  
F A X 番 号

担 当 医	石川 聡子	患 者 氏 名				
処方箋発行日		生 年 月 日	性別	男 ・ 女		
この情報を伝えることに対して同意を <input type="checkbox"/> 得た（患者本人・家族・他） <input type="checkbox"/> 得ていない						
〇患者は主治医への報告を拒否しているが、治療上重要だと考えられるため報告						
聞き取り日： 月 日      聞き取り方：口来局時 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> その他（ ）						
処方薬剤		アドヒアランス	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良（ ）			
<b>副作用モニタリング（有害事象共通用語基準v5.0）</b>						
Grade	0	1	2	3	4	発現時期
発熱	なし	37.5-39℃	>39-40℃	>40℃	—	
呼吸困難	なし	中等度の労作に伴う息切れ	極めて軽度の労作に伴う息切れ	安静時の労作に伴う息切れ	生命を脅かす	
咳嗽	なし	市販の医薬品を要する	身の回り以外の日常生活動作の制限	身の回りの日常生活動作の制限	—	
倦怠感	なし	だるさがあるまたは元気がない	身の回り以外の日常生活動作を制限するだるさがある	身の回りの日常生活動作を制限するだるさがある	—	
下痢	なし	普段より1～3回/日多い	普段より4～6回/日多い	普段より7回/日以上多い	生命を脅かす	
悪心	なし	吐き気はあったが食事摂取量は変わらず	吐き気で食事量が減った	吐き気で食事が摂れない	—	
口腔粘膜炎	なし	軽度の痛みで食事摂取量は変わらず	痛みを認め食事に工夫を要する	痛みが強く食事が摂れない	生命を脅かす	
関節炎	なし	炎症/紅斑/関節腫脹を伴う軽度の疼痛	炎症/紅斑/関節腫脹を伴う日常生活動作の制限	不可逆的な関節障害による日常生活動作の制限	—	

# 表面＝情報提供依頼書

## 医師が患者様へ配付



患者 医師

調剤薬局に持参してください

## 患者が調剤薬局へ持参



薬剤師 患者

先生に持参するよう言われました

## 副作用状況等の確認依頼

- 薬剤や投与サイクルによって  
電話の予定目安が異なります

エベロリムス(アフィニール®) + ホルモン剤

### 施設間情報連絡書

調剤薬局様 御中

金沢大学附属病院  
乳腺外科 石川聡子

当用紙を持参された患者様の服薬指導にあたり  
裏面の服薬情報提供書を用いた情報提供をお願いします。

※本日の容態は聞き取りましたので、**約 週間後**の容態をお聞きいただけますと幸いです

コメント

特に変わったことはありません

トレーシングレポートに関する相談窓口  
外来化学療法センター  
TEL：076-265-2000（内線：7045）

# 裏面＝トレーニングレポート

指定期間に副作用確認を実施(テレフォントラッキング)



お薬はちゃんと飲めていますか？  
体調にお変わりはないですか？

薬剤師

トレーニングレポートに記入後、FAXにて送信



それぞれの薬剤に応じたフォーマット

mTOR阻害剤 : エベロリムス(アフィニートル®)

CDK4/6阻害剤 : パルボシクリブ(イブランス®)

アベマシクリブ(ページニオ®)

経口5-FU系薬剤 : S-1(ティーエスワン®)

カペシタビン(ゼローダ®)

チェック式で記入できる簡易型フォーマット

- 特に注意すべき副作用を抜粋
- 色がついている部分は、外来へ電話相談を促す目安

エベロリムス(アフィニートル®) + ホルモン剤				
服薬情報提供書 (トレーニングレポート)				
金沢大学附属病院 乳腺外科				報告日： 年 月 日
御中			保険薬局名	
			薬剤師氏名	
			住 所	
			電話 番号	
			FAX 番号	
担 当 医	石川 聡子	患 者 氏 名		
処方箋発行日		生 年 月 日	性別	男 ・ 女
<input type="checkbox"/> この情報を与えることに対して同意を得た (患者本人・家族・他 ) <input type="checkbox"/> 電話フォローアップ不可のため下記空欄にてFAX送付します				
聞き取り日： 月 日		聞き取り方： <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> その他 ( )		
アドヒアランス	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 ( )			
副作用モニタリング (有害事象共通用語基準v5.0)				
Grade	発現時期	1	2	3
発熱	なし	37.5-39℃	39-40℃	>40℃
呼吸困難	なし	中等度の労作に伴う息切れ	極めて軽度の労作に伴う息切れ	安静時の労作に伴う息切れ
咳嗽	なし	市販の医薬品を要する	身の回り以外の日常生活動作の制限	身の回りの日常生活動作の制限
倦怠感	なし	だるさがある または元気がない	身の回り以外の日常生活動作を制限するだるさがある	身の回りの日常生活動作を制限するだるさがある
下痢	なし	普段より1~3回/日多い	普段より4~6回/日多い	普段より7回/日以上多い
悪心	なし	吐き気はあったが 食事摂取量は変わらず	吐き気で食事が減った	吐き気で食事が摂れない
口腔粘膜炎	なし	軽度の痛みで 食事摂取量は変わらず	痛みを認め 食事に工夫を要する	痛みが強く 食事が摂れない
関節炎	なし	炎症/紅斑/関節腫脹を伴う 軽度の疼痛	炎症/紅斑/関節腫脹を伴う 日常生活動作の制限	不可逆的な関節障害による 日常生活動作の制限
※色がついている部分に該当した場合、患者様に外来へのご相談を促して下さい (乳腺外来：076-265-2921) ※発熱の有害事象共通用語基準v5.0 Grade1・38℃-37.5℃へ変更				
副作用に関する具体的な内容や指示した対応法				
医療機関からの返答				
※この情報伝達は疑義照会ではありません				
↑ FAX送信：金沢大学附属病院 薬剤部 ↑ 076-234-4280				

## <運用・TRの流れ>

① 医師が**院外処方箋と一緒に**、**TR**を患者に配付。



② (初回)病院薬剤師が薬剤指導を実施・**TR**のついて説明。

③ 薬局薬剤師が薬剤指導を実施。

指定期間に副作用確認(テレフォンフォローアップ)。

記載した**TR**をFAX送信。⇒ 送信先: 薬剤部。

④ **TR**は、乳腺外科・薬剤部で保管し情報共有・返信(医師)。

<連絡体制> ※専用TRに記載

- ・保険薬局からの薬剤部への相談窓口は、外来化学療法センター(連携充実加算)
- ・緊急時には、乳腺外科直通番号記載