

レジメン番号： 07-007 / 肝臓7

適応疾患： 肝細胞癌

レジメン名： 5-FU+アイエーコール

化学療法内容

(1コース 4~6週間)

Rp	薬剤名	標準量	投与スケジュール(日)					
			1	8	15	22	28	~
1	ヴィーン3G(500) 点滴静注(メイン) 180分	1 B	↑	↑	×	×		
2	グラニセトロンバッグ(3mg/50mL) 点滴静注(サブ) 15分	1 B	↑	↑	×	×		
3	アイエーコール 生食(50) 肝動注 10分	18.8 mg/m ² 1 B	↑	↑	×	×		
4	5-FU ※1 ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa(300) 生食(50) 肝動注 5日間で持続投与	1650 mg/m ² 1 V 1 B	↑	↑	×	×		
5	ヘパフラッシュ 肝動注 5-FU投与前にフラッシュ	1 A	↑	↑	×	×		

※1 330 mg/m²/日×5日間、最大2500mg/body。総液量96mL(インフューザーポンプSV-1使用)。

レジメン番号： 07-025 / 肝臓25

適応疾患： 肝細胞癌

レジメン名： サイラムザ

化学療法内容

(1コース 2 週間)

Rp	薬剤名	標準量	投与スケジュール(日)		
			1	8	14
	レスタミンコーワ錠(10) 経口	5 T サイラムザ開始30分前に内服	↑	×	
1	サイラムザ 生食(250) 点滴静注	※1 8 mg/kg 1 B 初回60分、2回目以降30分	↑	×	
2	生食(50) 点滴静注	1 B 全開でフラッシュ	↑	×	

※1 投与時はインラインフィルターを用いる。

レジメン番号： 07-031 / 肝臓31

適応疾患： 切除不能な肝細胞癌

レジメン名： テセントリク+アバスチン

化学療法内容

(1コース 3 週間)

Rp	薬剤名	標準量	投与スケジュール(日)			
			1	8	15	21
1	テセントリク 生食(250) 点滴静注	※1 1200 mg/body 1 B 初回60分、2回目以降30分	↑	×	×	
2	生食(50) 点滴静注	1 B 全開でフラッシュ	↑	×	×	
3	アバスチン 生食(100) 点滴静注	15 mg/kg 1 B 初回90分、2回目60分、以降30分	↑	×	×	
4	生食(50) 点滴静注	1 B 全開でフラッシュ	↑	×	×	

※1 投与時はインラインフィルターを用いる。