

レジメン番号： 12-004 / 皮膚4

適応疾患： 根治切除不能な悪性黒色腫

レジメン名： ヤーボイ

化学療法内容

(1コース 3 週間)

Rp	薬剤名	標準量	投与スケジュール(日)			
			1	8	15	21
1	ヤーボイ ※1 生食(100) 点滴静注 30分	3 mg/kg 1 B	↑	×	×	
2	生食(50) 点滴静注 全開でフラッシュ	1 B	↑	×	×	

※1 投与時はインラインフィルターを用いる。投与は4回まで。  
最終濃度が1~4mg/mLとなるように調製する  
(125mg未満:1mg/mL、125mg以上:Total 100mLとする)。

レジメン番号： 12- 008 / 皮膚8

適応疾患： 悪性黒色腫

レジメン名： ダカルバジン(5日投与)

化学療法内容

(1コース 4 週間)

Rp	薬剤名	標準量	投与スケジュール(日)						
			1	2	3	4	5	・	28
1	デキサート(6.6mg/2mL) グラニセトロンバッグ(3mg/50mL) 点滴静注 15分	1 V 1 B	↑	↑	↑	↑	↑		
2	ダカルバジン ※1 蒸留水(100)・・・溶解用 生食(100) 点滴静注 15分	200-220 mg/m <sup>2</sup> 1 B 1 B	↑	↑	↑	↑	↑		
3	生食(50) 点滴静注 全開でフラッシュ	1 B	↑	↑	↑	↑	↑		

※1 ダカルバジン投与時は投与ルートおよび点滴バッグ本体を遮光する。

レジメン番号： 12-009 / 皮膚9

適応疾患： 悪性黒色腫

レジメン名： オプジーボ(隔週)

化学療法内容

(1コース 2 週間)

Rp	薬剤名	標準量	投与スケジュール(日)		
			1	8	14
1	オプジーボ ※1 生食(50) 点滴静注 30分	240 mg/body 1 B	↑	×	
2	生食(50) 点滴静注 全開でフラッシュ	1 B	↑	×	

◆ 術後補助療法の場合は、投与期間は12ヶ月間までとする。

※1 投与時はインラインフィルターを用いる。

レジメン番号： 12-011 / 皮膚11

適応疾患： 悪性黒色腫

レジメン名： キイトルーダ(3週毎)

化学療法内容

(1コース 3 週間)

Rp	薬剤名	標準量	投与スケジュール(日)			
			1	8	15	21
1	キイトルーダ ※1 生食(100) 点滴静注 30分	200 mg/body 1 B	↑	×	×	
2	生食(50) 点滴静注 全開でフラッシュ	1 B	↑	×	×	

◆ 術後補助療法の場合は、投与期間は12ヶ月間までとする。

※1 投与時はインラインフィルターを用いる。

レジメン番号： 12-015 / 皮膚15

適応疾患： 根治切除不能な悪性黒色腫

レジメン名： オブジーボ+ヤーボイ

化学療法内容

(1コース 3 週間)

Rp	薬剤名	標準量	投与スケジュール(日)			
			1	8	15	21
1	オブジーボ 生食(100) 点滴静注 30分	※1 80 mg/body 1 B	↑	×	×	
2	生食(100) 点滴静注 30分	1 B	↑	×	×	
3	ヤーボイ 生食(100) 点滴静注 30分	※2 3 mg/kg 1 B	↑	×	×	
4	生食(50) 点滴静注 全開でフラッシュ	1 B	↑	×	×	

◆ 投与は4回まで。

※1 投与時はインラインフィルターを用いる。

※2 投与時はインラインフィルターを用いる。

最終濃度が1～4mg/mlとなるように調製する(125mg未満:1mg/ml、125mg以上:Total 100mLとする)。