

レジメン番号：15-001 / 骨・軟部1

適応疾患：悪性骨・軟部腫瘍

レジメン名：ドキシソルビシン

化学療法内容

(1コース 3 週間)

Rp	薬剤名	標準量	投与スケジュール(日)			
			1	8	15	21
1	デキサート(6.6mg/2mL) アロカリス(235mg/10mL) パロノセトロンバッグ(0.75mg/50mL) 点滴静注 30分	1.5 V 1 V 1 B	↑	×	×	
2	ドキシソルビシン 生食(100) 点滴静注 60分	60~75 mg/m <sup>2</sup> 1 B	↑	×	×	
3	生食(50) 点滴静注 全開でフラッシュ	1 B	↑	×	×	
	デカドロン錠(0.5) 経口 1日2回朝・昼食後に分けて内服	16 T	day2~4			

レジメン番号： 15- 002 / 骨・軟部2

適応疾患： 血管内腫

レジメン名： Weekly パクリタキセル(3投1休)

化学療法内容

(1コース 4 週間)

Rp	薬剤名	標準量	投与スケジュール(日)				
			1	8	15	22	28
	レスタミンコーワ錠(10) 経口	5 T パクリタキセル開始30分前に内服	↑	↑	↑	×	
1	デキサート(6.6mg/2mL) ガスター(20mg/2mL) 生食(50) 点滴静注	1 V 1 A 1 B 15 分	↑	↑	↑	×	
2	生食(100) 点滴静注	1 B 30 分	↑	↑	↑	×	
3	パクリタキセル ソルデム1(200) 点滴静注	※1 60~100 mg/m <sup>2</sup> 1 B 60 分	↑	↑	↑	×	
4	生食(50) 点滴静注	1 B 全開でフラッシュ	↑	↑	↑	×	

※1 投与時はインラインフィルターを用いる。アルコール過敏症の患者に投与不可。

アレルギー反応予防のため、前投薬として必ずH1拮抗薬とH2拮抗薬、ステロイド剤を用いる。

レジメン番号： 15- 008 / 骨・軟部8

適応疾患： 悪性軟部腫瘍

レジメン名： ハラヴェン

化学療法内容

(1コース 3 週間)

Rp	薬剤名	標準量	投与スケジュール(日)			
			1	8	15	21
1	デキサート(6.6mg/2mL) 生食(50) 点滴静注 15分	1 V 1 B	↑	↑	×	
2	ハラヴェン 生食(50) 点滴静注 全開(ポンプ使用しない)	1.4 mg/m <sup>2</sup> 1 B	↑	↑	×	
3	生食(50) 点滴静注 全開でフラッシュ	1 B	↑	↑	×	

レジメン番号： 15- 027 / 骨・軟部27

適 応 疾 患：再発又は難治性のユーイング肉腫

レ ジ メ ン 名：テモゾロミド+トポテシン

化学療法内容

(1コース 3 週間)

Rp	薬剤名	標準量	投与スケジュール(日)													
			1	2	3	4	5	・	8	9	10	11	12	・	21	
	アプレピタントカプセル(125) 経口	1 C テモゾロミド内服60分前に内服	↑	×	×	×	×		×	×	×	×	×			
	アプレピタントカプセル(80) 経口	1 C 1日1回朝食後に内服	×	↑	↑	×	×		×	×	×	×	×			
	テモゾロミド 経口	100 mg/m <sup>2</sup> /日 トポテシン開始60分前に内服(空腹時)	↑	↑	↑	↑	↑		×	×	×	×	×			
1	グラニセトロンバッグ(3mg/50mL) 点滴静注	1 B 15 分	↑	↑	↑	↑	↑		↑	↑	↑	↑	↑			
2	トポテシン ソルデム1(200) 点滴静注	20 mg/m <sup>2</sup> 1 B 60 分	↑	↑	↑	↑	↑		↑	↑	↑	↑	↑			
3	生食(50) 点滴静注	1 B 全開でフラッシュ	↑	↑	↑	↑	↑		↑	↑	↑	↑	↑			